

# Tamanhos mínimos de captura de peixes marinhos

Regiões Sudeste e Sul

| <b>Nome Vulgar</b>                   | <b>Nome Científico</b>                                    | <b>Tamanho Mínimo</b> |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Badejo de Areia                   | <i>Mycteroperca microlepis</i>                            | 30                    |
| 2. Badejo Mira                       | <i>Mycteroperca acutirostris</i>                          | 23                    |
| 3. Badejo Quadrado                   | <i>Mycteroperca bonaci</i>                                | 45                    |
| 4. Bagre                             | <i>Cathorops spixii</i>                                   | 12                    |
| 5. Bagre                             | <i>Genindes genidens</i>                                  | 20                    |
| 6. Bagre Branco                      | <i>Genindes barbatus</i>                                  | 40                    |
| 7. Batata                            | <i>Lopholatilus villarii</i>                              | 40                    |
| 8. Cabrinha                          | <i>Prionotus punctatus</i>                                | 18                    |
| 9. Cação anjo asa longa              | <i>Squatina argentina</i>                                 | 70                    |
| 10. Cação listrado/Malhado           | <i>Mustelus fasciatus</i>                                 | 100                   |
| 11. Cação-anjo-asa curta             | <i>Squatina occulta</i>                                   | 70                    |
| 12. Cação-anjo-espinhoso             | <i>Squatina guggenheim</i>                                | 70                    |
| 13. Cação-bico doce                  | <i>Galeorhinus galeus</i>                                 | 110                   |
| 14. Caçonete                         | <i>Mustelus schmittii</i>                                 | 50                    |
| 15. Castanha                         | <i>Umbrina canosai</i>                                    | 20                    |
| 16. Cherne                           | <i>Epinephelus niveatus</i>                               | 45                    |
| 17. Corvina                          | <i>Micropogonias furnieri</i>                             | 25                    |
| 18. Garoupa                          | <i>Epinephelus marginatus</i>                             | 47                    |
| 19. Goete                            | <i>Cynoscion jamaicensis</i>                              | 16                    |
| 20. Linguado                         | <i>Paralichthys patagonicus / P. brasiliensis</i>         | 35                    |
| 21. Miraguaia                        | <i>Pogonias cromis</i>                                    | 65                    |
| 22. Palombeta                        | <i>Chloroscombrus chrysurus</i>                           | 12                    |
| 23. Pampo Viúva                      | <i>Parona signata</i>                                     | 15                    |
| 24. Pampo/Gordinho                   | <i>Peprilus paru</i>                                      | 15                    |
| 25. Papa-terra branco ou Betara      | <i>Menticirrhus littoralis</i>                            | 20                    |
| 26. Parati ou Saúba                  | <i>Mugil curema</i>                                       | 20                    |
| 27. Peixe-Espada                     | <i>Trichiurus lepturus</i>                                | 70                    |
| 28. Peixe-Porco, Peroá ou Cangulo(*) | <i>Balistes capriscus / B. vetula</i>                     | 20                    |
| 29. Peixe-Rei                        | <i>Odonthestes bonariensis / Atherinella brasiliensis</i> | 10                    |
| 30. Pescada Olhuda ou Maria Mole     | <i>Cynoscion striatus</i>                                 | 30                    |
| 31. Pescadinha                       | <i>Macrodon ancylodon</i>                                 | 25                    |
| 32. Robalo Flexa                     | <i>Centropomus undecimalis</i>                            | 50                    |
| 33. Robalo peba ou peva              | <i>Centropomus parallelus</i>                             | 30                    |
| 34. Sardinha-Lage                    | <i>Opisthonema oglinum</i>                                | 15                    |
| 35. Tainha                           | <i>Mugil platanus / Mugil Liza</i>                        | 35                    |
| 36. Trilha                           | <i>Mullus argentinae</i>                                  | 13                    |
| 37. Tubarão Martelo liso             | <i>Sphyrna zygaena</i>                                    | 60                    |
| 38. Tubarão Martelo recortado        | <i>Sphyrna lewini</i>                                     | 60                    |
| 39. Viola                            | <i>Rhinobatos horkelii</i>                                | 80                    |

OBS. O tamanho mínimo de captura é medido da ponta do focinho até a furca da nadadeira caudal.

Portaria IBAMA nº 73, de 24 de novembro de 2003